



Psychotraumatologie centrée compétences et clinique de l'exil

NOVEMBRE 2022

LAETITIA DE SCHOUTHEETE

Objectifs pour ces deux jours

Jour 1: Psychotraumatologie centrée compétences et Stabilisation

Jour 2 : Spécificités de la clinique de l'exil et chocs interculturels et **Outils d'accompagnements concrets pour les personnes migrantes** - Utiliser les ressources culturelles et communautaires



Mercredi

- ✓ L'approche centrée compétences
- ✓ les questions centrées ressources
- ✓ L'impact du traumatisme sur le cerveau : mieux comprendre pour mieux intervenir
- ✓ Se stabiliser soi pour stabiliser l'autre
- ✓ La fenêtre de tolérance
- ✓ La cohérence cardiaque
- ✓ Les neurones miroirs
- ✓ Outils de stabilisation immédiats



CRÉER DE BONNES
CONDITIONS DE TRAVAIL
DANS L'ICI ET
MAINTENANT

Plus les blessures sont anciennes et/ou multiples :

- ✓ Plus elles vont gêner le fonctionnement de la pensée
- ✓ Plus le corps a besoin d'être sécurisé
- ✓ Plus de bonnes conditions de travail sont nécessaires à créer

Si la personne se sent suffisamment en sécurité dans son corps, alors le cerveau va pouvoir fonctionner dans son intégralité (sensations, émotions, pensées)

- ✓ La personne va être en mesure de ressentir et de partager ses émotions
- ✓ De trouver ce dont elle a besoin pour moins souffrir



Echelles de sécurité

- ✓ Poser cette échelle dès le début de la relation :
 - ✓ Evalue la qualité de la relation
 - ✓ Donne le message à la personne que nous sommes soucieux de sa sécurité, de son bien-être
 - ✓ Rien que de questionner la sécurité, fait monter sur l'échelle
- ✓ Les personnes qui ne sont pas en sécurité pourront refuser la relation d'aide.
- ✓ Essentiel de travailler la sécurité



Caractéristiques des questions centrées compétences

- ✓ Questions ouvertes
- ✓ Formulées positivement
- ✓ Privilégier le « Comment » plutôt que le « Pourquoi »
- ✓ Centrées sur les ressources et compétences
- ✓ Centrée sur l'avenir



Exemples de questions de survie

- ✓ Comment avez vous fait pour survivre (résister, rester debout ...) dans cette situation ?
- ✓ Comment avez-vous fait pour tenir dans des conditions aussi difficiles ?
- ✓ Comment faites vous pour être encore là ? Qu'est ce qui vous aide à tenir ?
- ✓ Comment faites vous pour honorer les rdv, vous lever le matin,

Questions qui permettent :

- ✓ De voir la personne comme un survivant, avec des ressources qu'il ignore
- ✓ D'interroger ses capacités de résilience
- ✓ De lui faire prendre conscience de ses ressources



EXPERTISE PARTAGÉE


- ✓ L'accompagnant est expert en accompagnement
- ✓ La personne est experte de sa vie

L'ACCOMPAGNANT EST RESPONSABLE

- ✓ D'un cadre sécurisant (échelles)
- ✓ Du processus permettant un travail dans de bonnes conditions (attention portée au corps)

LA PERSONNE EST RESPONSABLE


- ✓ Du contenu à travailler
- ✓ Des changements dans sa vie



Restauration d'un contexte de CHOIX dans l'accompagnement

Au niveau :

- ✓ du confort et de la sécurité durant les rencontres
- ✓ du lieu des rencontres
- ✓ du « stop » possible
- ✓ des outils proposés par l'accompagnant
- ✓ du rythme des rencontres
- ✓ des objectifs de l'accompagnement
- ✓ de leur ordre de priorité
- ✓ De la possibilité de valider ou de co-construire les hypothèses proposés par l'accompagnant



Un événement traumatique est :

un événement extérieur au sujet et imprévisible

- ✓ qui engendre une forte **angoisse (effroi)**
- ✓ qui implique la mort, **une menace de mort**
 - ✓ pour soi ou pour un proche
- ✓ un sentiment d'**impuissance** face à l'incident
- ✓ une **perturbation aiguë des schémas de vie** (croyances de base, carte du monde)




TROUBLES DE
STRESS POST
TRAUMATIQUE

Un Trouble de Stress Post Traumatique se décèle à partir de trois mois après un événement

Critères du TSPT (Association
Psychiatrique Américaine, 2013)

1. reviviscences intrusives
2. évitement
3. changements négatifs des
cognitions et de l'humeur
4. activation neuro-végétative

Prévalence: 90% de la population soumise à un
événement potentiellement traumatique, 7-14%
développeront TSTP (Wittmer Godard, 2013)



TROUBLES DIFFÉRÉS

2 jours 1 mois 3 mois délai après l'événement
traumatisant

Réaction
immédiate État de Stress
Aigu (ESA) État de Stress
Post-Traumatique
aigu (ESPT aigu) État de Stress
Post-Traumatique
chronique (ESPT chronique)

Après un événement potentiellement traumatique

- ✓ Instant T => 1 mois : phase de vulnérabilité
Apparition des symptômes de stress aigu :
reviviscence, hyperactivation, évitement
- ✓ Entre 1 et 3 mois : résolution OU chronicisation
- ✓ Si symptômes de stress aigu persistent + de 3
mois => ESPT.
 - ✓ On ne parle pas de Trauma avant 3 mois
 - ✓ Avant 3 mois : « événement
potentiellement traumatique »

LES DIFFERENTS TRAUMATISMES




Les différents types de traumatismes


On peut distinguer 6 types de traumatisme:

- **Simple**: un événement unique
- **Multiple**: succession de traumatismes simples
- **Complexe**: événements adverses qui ont commencé tôt et qui se sont multipliés, associés avec troubles attachement
- **Familial**: touche plus d'un membre d'une famille ou tout le groupe
- **Transgénérationnel**: séquelles post traumatique d'événements que la personne n'a pas vécu
- **Vicariant**: professionnel travaillant avec des personnes traumatisées

L'IMPACT DU TRAUMATISME SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION




Réactions du cerveau face au danger




Elles dépendent de la **gravité du trauma**, du **type d'attachement**, de la **fenêtre de tolérance** et de la **sensibilisation éventuelle par des traumas précédents**

DR EMMANUEL CONTAMIN



En cas de danger/ Trauma, activation de l'amygdale (système d'alarme) :

- ✓ Libération d'hormones de stress (adrénaline, cortisol) pour répondre au danger
- ✓ Court circuite le chemin habituel du traitement de l'information
- ✓ Si impossibilité de fuir ou combattre :
SIDERATION = déconnexion de l'amygdale du cortex et hippocampe (réaction de survie)
- ✓ Anesthésie émotionnelle et sensorielle.
Sentiment d'irréalité : DISSOCIATION



TOUT TRAUMATISME EST GUERISSABLE


QUELQUE SOIT SON AMPLEUR

Ce qui n'est terminé peut toujours se faire dans de bonnes conditions.

Après le trauma?

- Selon la recherche, 75 % des personnes guérissent spontanément, c'est à dire ils n'ont plus de symptômes décelables par les outils de mesure
 - Est-ce que la blessure est tout à fait digérée?
 - La dimension d'apprentissage est réussie
 - Avec des capacités de prévention
 - L'événement est classé dans le passé avec un corps apaisé lorsqu'on y pense
- Un récit est possible, partageable de manière adéquate, permettant de partager des émotions, sans que celles-ci ne débordent

↔ H.Dellucci - Cercle de Compétences



GEL DES DEUILS

Le deuil congelé (J-C Métraux)

- ✓ Lorsqu'il y a une menace vitale et que notre énergie doit être focalisée sur la survie, On peut agir comme s'il n'y avait pas de deuils.

Les deuils impossibles

- ✓ On ne retrouve pas les corps
- ✓ On ne peut pas honorer les morts



LA FASCINATION DU TRAUMATISME

- ✓ Etre conscient de la fascination
- ✓ Rester bien ancrer dans son corps (cohérence cardiaque, pleine conscience...)
- ✓ Etre le gardien de la ligne du temps : Remettre le passé et le futur autour du temps du trauma
- ✓ Proposer et pratiquer des exercices de stabilisation dès que nécessaire, en commençant par soi même !
- ✓ La cohérence cardiaque aide à prévenir le risque de traumatisation vicariante




Fenêtre de tolérance



REFLEXES DE SURVIE DU SÈME NERVEUX AUTONOME

COMBAT OU FUITE

- Effets notables (gauche): pupilles dilatées, bouches sèche, muscle du cou et des épaules tendus, accélération du cœur, douleurs à la poitrine, palpitation, muscles prêts à l'action, respiration rapide superficielle (hyperventilation) besoin d'oxygène
- Effets cachés (droite) : Cerveau prêt à l'action, décharge d'adrénaline pour le combat ou la fuite, pression du sang qui augmente, libération de glucose par le foie pour donner de l'énergie aux muscles, digestion ralentie, sphincter qui se contractent et se relâchent par la suite, Cortisol libéré et diminution du système immunitaire



HYPER ACTIVATION PHYSIOLOGIQUE

Fuite OU Combat

- ✓ Agitation
- ✓ Logorrhée
- ✓ Tensions plexus et ailleurs
- ✓ Besoin de bouger
- ✓ Rougeurs visage
- ✓ Respiration accélérée
- ✓ La personne n'entend plus ce que vous dites
- ✓ Le regard est fuyant
- ✓ Etat de panique ...



SOUS ACTIVATION PHYSIOLOGIQUE

Sidération Figement

- ✓ Perte de force, Impression de se liquéfier
- ✓ Bourdonnements dans les oreilles
- ✓ Ne plus avoir de jambes, fourmillements
- ✓ Plus moyen de trouver des mots
- ✓ Impression d'être seul au monde dans son corps pas reconnu comme le sien
- ✓ La personne blêmit, s'affaisse, ne parle plus
- ✓ Blancs de pensée, de parole, ne comprend plus ce qui se passe
- ✓ Confusion
- ✓ Respiration superficielle
- ✓ Fatigue


Stabilisation : hiérarchie des interventions

4. Aller s'apaiser ailleurs

Le lieu sûr
Créer des réseaux
neuronaux positifs

2. Mettre de côté

Le contenant
Quand le corps est
calme



3. Top down

Exercices d'auto-
apaisement:
54321
Cohérence cardiaque

1. Bottom up

Exercices d'ancrage et
d'orientation
= apaiser le corps
Le thérapeute guide



ENTRER EN ALLIANCE AVEC LE NIVEAU ARCHAÏQUE/
REPTILIEN DU CERVEAU

- ✓ Confort physiologique
- ✓ Co posture
- ✓ Question / sentiment de sécurité ici et maintenant
- ✓ Changez ce qui est possible pour plus de confort
- ✓ Respirez en cohérence cardiaque
- ✓ Ajustement prosodique
- ✓ Utiliser les mots de la personne



Signes qui doivent nous alerter :

- ✓ Agitation motrice
- ✓ Tremblements
- ✓ Crise d'angoisse
- ✓ Gestes de panique
- ✓ Abréaction
- ✓ Logorrhée



Signes qui doivent nous alerter

- ✓ Temps de latence entre la question du thérapeute et la réponse de la personne
- ✓ Absence de réponse
- ✓ Absence d'attention auditive ou bourdonnements oreilles
- ✓ Absence de contact visuel ou sensation de « brouillard »
- ✓ Expression de fatigue: « J'ai sommeil », « je me sens épuisée »
- ✓ Discours incohérent, bout de phrases
- ✓ Pâleur / Rougeurs
- ✓ Manque de force dans les bras, et dans les jambes ou extrémités froides ou qui picotent


Stabilisation : hiérarchie des interventions

4. Aller s'apaiser ailleurs

Le lieu sûr
Créer des réseaux
neuronaux positifs

2. Mettre de côté

Le contenant
Quand le corps est
calme



3. Top down

Exercices d'auto-
apaisement:
54321
Cohérence cardiaque

1. Bottom up

Exercices d'ancrage et
d'orientation
= apaiser le corps
Le thérapeute guide



EXERCICES D'ANCRAGE

- ✓ Ressentez-vous la chaise sur laquelle vous êtes assis-e? Que ressentez vous le plus nettement: l'assise ou le dossier?
- ✓ Pouvez vous faire en sorte de ressentir les 2 à la fois ?
- ✓ Bougez vos pieds dans vos chaussures. Ressentez vous vos pieds ?
- ✓ Assis, bras croisés et mains sur l'intérieur des genoux : poussez vos mains tout en serrant vos genoux
- ✓ Pouvez vous vous lever : mettez votre poids sur une jambe, puis sur l'autre
- ✓ Tournez le haut de votre corps: regardez ce qu'il y a derrière vous
- ✓ Passes d'un objet doux ou peluche



EXERCICES SPECIFIQUES EN CAS DE SUR ACTIVATION (TENSIONS +++)

- ✓ Marchez sur la pointe des pieds, sur une ligne imaginaire tracée sur le sol
- ✓ Pressez une balle rebondissante, ou un galet aussi fort que vous le pouvez, en imaginant que vous y mettez toute votre tension
- ✓ Poussez les murs en y mettant toute votre force
- ✓ Chaise contre le mur
- ✓ Tirer les mains : si gestes de panique



EXERCICES D'ORIENTATION

- ✓ Orienter la personne dans l'environnement :
 - ✓ Où êtes vous maintenant?
 - ✓ De quelle couleur sont les murs?
 - ✓ Combien de lumières voyez vous allumées?
 - ✓ Comptez des choses ...
 - ✓ Citez moi un objet de couleur rouge que vous voyez...
- ✓ Orienter la personne dans le temps :
 - ✓ Quel jour sommes nous ?
 - ✓ Qu'avez vous fait hier ?
 - ✓ Qu'avez vous prévu ce soir ?
- ✓ 54321 : je vois J'entends Je sens



LE 5.4.3.2.1

Version Classique (auto-hypnotique, de B. ERICKSON))

- Lister 5 choses que je vois
- 5 bruits que j'entends
- 5 sensations que je ressens concrètement dans mon corps

- Puis : 4 choses que je vois
- 4 bruits que j'entends
- 4 sensations que je ressens concrètement dans mon corps


- Puis..... 3.....2.....1.....




AUTRES EXERCICES DE STABILISATION CORPORELLE

- ✓ Tâche cognitive : comptez à partir de 100 en descendant de 7 en 7
- ✓ Exercices respiratoires
 - ✓ Respiration profonde et lente (cohérence cardiaque)
 - ✓ Respiration anti panique (Inspire rapide / 4 sec bloquées / Expire lentement)
- ✓ Offrez quelque chose à boire ou demander d'activer la salivation : active le système d'apaisement
- ✓ Si la personne a froid: lui permettre de se couvrir



<p>MSF- URGENCE EBOLA- SIERRA LEONE</p> 	<p><u>Paroles monnaies, précieuses, sacrées</u></p> <p>Les <u>paroles monnaie</u> n'engagent pas le donateur. Elles sont échangées avec n'importe qui.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'accompagnant donne généralement des paroles monnaie (questions, anamnèse...) <p>Les <u>paroles précieuses</u> engagent. Elles ne peuvent circuler n'importe où, n'importe comment.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La personne parle de sa souffrance, de ses incompétences, de ses échecs, de ses sentiments, de ses valeurs... <p>Les <u>paroles sacrées</u> (secrètes, souvent tues). Elles ne peuvent sortir du colloque intime.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La personne parle de ce qui affecte son identité (trauma), de la honte... (« Je n'ai jamais dit ça à personne »)
---	--




MSF- URGENCE EBOLA- SIERRA
LEONE

Paroles monnaies, précieuses, sacrées

« L'accompagnant paie avec des paroles monnaie les paroles précieuses et sacrées de la personne... »

Réciprocité négative => déséquilibre !

J.-C. Metraux



LE CONTENANT



LE CONTENANT, PAS à PAS

- La personne choisit un contenant (= un objet qui se ferme comme boîte, conteneur de camion, coffre fort...)
- Description précise du contenant (forme, taille, couleur, inscription...)
- Ouvrir mentalement le contenant
- Laisser aller comme du sable, déposer tous les souvenirs difficiles dans le contenant :
 - Du passé
 - Du présent
 - Du futur




- Dire aux choses mises dans le contenant :
 - Qu'on ne va pas les oublier mais que nous ne pouvons pas s'occuper d'elles en même temps
 - Que nous y reviendrons quand le patient l'aura décidé
 - Et à son rythme
- Vérifiez si « tout » est bien dans le contenant.
- Fermez le contenant et le ranger dans un endroit où il pourra attendre patiemment qu'on y revienne.

Stabilisation : hiérarchie des interventions

4. **Aller s'apaiser ailleurs**
Le lieu sûr
Créer des réseaux neuronaux positifs

2. **Mettre de côté**
Le contenant
Quand le corps est calme

3. **Top down**
Exercices d'auto-apaisement:
54321
Cohérence cardiaque



1. **Bottom up**
Exercices d'ancrage et d'orientation
= apaiser le corps
Le thérapeute guide



LE 5.4.3.2.1

Version Classique (auto-hypnotique, de B. ERICKSON))

- Lister 5 choses que je vois
- 5 bruits que j'entends
- 5 sensations que je ressens concrètement dans mon corps

- Puis : 4 choses que je vois
- 4 bruits que j'entends
- 4 sensations que je ressens concrètement dans mon corps

- Puis..... 3.....2.....1.....


Stabilisation : hiérarchie des interventions

4. Aller s'apaiser ailleurs
Le lieu sûr
Créer des réseaux neuronaux positifs

2. Mettre de côté
 Le contenant
 Quand le corps est calme

3. Top down
 Exercices d'auto-apaisement:
 54321
 Cohérence cardiaque

1. Bottom up
 Exercices d'ancrage et d'orientation
 = apaiser le corps
 Le thérapeute guide





LE LIEU SÛR

- ✓ N'abordez jamais un contenu potentiellement traumatique sans lieu sûr
- ✓ Des lieux sûrs peuvent être des états sûrs, une activité sûre, une expérience sûre ...
- ✓ Si la personne est en vie, il y en a au moins un.
- ✓ Maximum 5 SBA lentes
- ✓ Choisissez le type de SBA qui convient : visuelles, tapping, mouvement du papillon



Le Lieu Sûr, pas à pas

- ✓ Choisir un endroit réel / connu, ou imaginaire :
 - ✓ qui représente pour vous la sécurité
 - ✓ et dans lequel vous pouvez vous imaginer, si possible, seul.
- ✓ Attention : doit être exclusivement positif (pas de mauvais souvenir...)



- ✓ Décrivez avec le maximum de détails ce que vous y voyez (couleurs, paysages, textures...) + SBA
- ✓ Décrivez des sons plaisants et agréables que vous pouvez entendre + SBA
- ✓ Décrivez les sensations corporelles agréables que vous pouvez sentir + SBA
- ✓ Généralisez la sensation corporelle agréable au corps tout entier + SBA (cela peut prendre plusieurs sets)
- ✓ Faites la synthèse: l'image, les sons, les senteurs, les sensations corporelles et ajoutez un mot-clé + SBA

Installation du lieu sûr par étapes




COHÉRENCE CARDIAQUE

Allez viens !



*Toi et moi, on a besoin d'un endroit calme
et de 5 petites minutes... 🕒*

COHÉRENCE CARDIAQUE




COHÉRENCE CARDIAQUE

- ✓ Connexion entre cerveau émotionnel et cœur
- ✓ 2 branches qui les relient :
 - ✓ Système sympathique : fonctionne avec l'adrénaline, pour accélérer le rythme cardiaque, préparer le corps au combat ou à la fuite
 - ✓ Système parasympathique : ralentit le rythme cardiaque, faire baisse la tension artérielle, prépare l'organisme à la digestion...
- ✓ A chaque instant : cœur et émotions sont soumis à l'influence de ces 2 systèmes :
 - ✓ Ce qui se passe dans le cœur influence ce qui se passe dans nos émotions
 - ✓ Boucle qui module notre relation au monde et à notre physiologie

↳ H.Dellucci - Cercle de Compétences

COHÉRENCE CARDIAQUE



↳ H.Dellucci - Cercle de Compétences

COHÉRENCE CARDIAQUE

- Le site de David O' Hare:
- **Respirer en se mettant en cohérence cardiaque:** met le système sympathique et parasympathique ventral en cohérence
 - Respirer 6 fois par minute nous amène à nous mettre en cohérence cardiaque: a un effet calmant sur notre physiologie
 - Augmente la sensation de contrôle chez le client, mais aussi chez le thérapeute: le calme du thérapeute peut contaminer la physiologie du client
 - Augmente la DHEA, diminue le taux de Cortisol
 - Les effets de 5 min de cohérence cardiaque durent pendant plusieurs heures
 - Possibilité de dessiner une courbe sinusoïde en cohérence avec la respiration.
 - La respiration ventrale favorise la cohérence cardiaque

↳ H.Dellucci - Cercle de Compétences




Jeudi

- ✓ Le syndrome d'Ulysse
- ✓ Les thérapies traditionnelles
- ✓ Le jeu du barnga : dans la peau d'une personne réfugiée
- ✓ Les chocs interculturels
- ✓ Les ressources communautaires

LES FACTEURS DE STRESS LIÉS À L'EXIL





TRAUMATISME DE L'EXIL

Traumatisme de l'exil

Traumatismes complexes

- ✓ Traumatisme dans le pays d'origine
- ✓ Traumatisme dû à l'exil et au voyage
- ✓ Traumatisme dans le pays d'accueil

Teneur différente du trauma

- ✓ Guerre :
Intention délibérée d'anéantissement :
projetés hors humanité
- ✓ Catastrophe naturelle
Trauma de masse sans intention
délibérée



Les 3 aspects du stress

- ✓ L'intensité : Syndrome de stress post-traumatique
- ✓ La chronicité : l'insécurité dans le pays d'origine s'aggrave pendant le voyage et persiste dans le pays d'accueil.
Impuissance apprise, d'épuisement et de burn out.
- ✓ La multiplicité : difficultés et obstacles que la personne rencontre en émigrant, qui sont des facteurs de risque pour sa santé mentale.



Le syndrome d'Ulysse - Joseba Achotegui,
Université de Barcelone

Les différents niveaux de stress

- ✓ Traumas initiaux : ESPT
- ✓ La fuite et l'exil
- ✓ Demande de statut de réfugié ou clandestinité
- ✓ Sentiment de rejet / suspicion
- ✓ Sentiment de désespoir face à l'échec du projet migratoire

C'est donc normal de réagir comme ils réagissent



La syndrome d'Ulysse regroupe la symptomatologie du syndrome post traumatique et du stress chronique pathologique

Elle associe

- Symptômes dépressifs
- Symptômes anxieux
- Symptômes somatiques multiples
- Parfois : symptômes psychotiques
- + interprétations des troubles basés sur la culture de la personne

Pourtant le syndrome d'Ulysse n'est pas une pathologie et le support se doit d'être psychosocial avant tout



Le deuil migratoire pathologique, au cœur du syndrome d'Ulysse

Deuils multiples récurrents qui entraîne des bouleversements majeurs dans la vie de l'individu

La personne ne peut plus élaborer les deuils car elle est dans une situation de crise permanente



Le deuil migratoire pathologique, au cœur du syndrome d'Ulysse

- ✓ Perte de la famille et des êtres chers
 - ✓ Perte de la langue
 - ✓ Perte de la culture
- ✓ Perte du pays natal / de la terre
 - ✓ Perte du statut social
- ✓ Perte du contact avec le groupe d'appartenance
- ✓ Les risques pour l'intégrité physique

Sociétés à « univers unique » et sociétés à « univers multiples »

	Univers Unique	Univers Multiple
● Cause	Maladie	Intentionnalité
Etiologie	Du manque - Biologique - interactif	Du surplus - enfant ancêtre - enfant sorcier
Acteur social	- Maître du savoir rationnel - Expert	- Maître du savoir caché - Elu
Philosophie de l'intervention	Réparer les manques	-Recherche de l'intentionnalité

Sociétés à « univers unique » et sociétés à « univers multiples »

	Univers Unique	Univers Multiple
● Méthode	Diagnostique	Divination (objets reliés au sacré)
Lieu de l'investigation	Dans le malade	Dans le devin
Philosophie de la méthode	Interrogation fine du visible, du mesurable, du perceptible	Déplacement de l'intérêt - du visible vers l'invisible - de l'individuel vers le collectif - du fatal au réparable

Questions intéressantes à poser

- **Comment votre maladie est-elle expliquée dans votre pays ?**
- Logique médicale : maladie du corps et de la tête
- Logique magique : le mauvais œil, acte de vaudou, sort
- Logique religieuse : volonté de dieu, punition, karma, destin
- Logique biographique : conséquence des expériences passées
- Logique éducationnelle : résultat de la socialisation

- **Quelle est la cause de votre problème et comment vous l'envisagez ?**

- **Quand est ce que le problème a commencé. Pourquoi selon vous le problème a commencé à ce moment-là ?**

- **Comment est ce que votre maladie serait traitée dans votre pays ?**
- Assurez vous que votre patient ait la possibilité de vous parler des rituels, des cures, ...

- **Quel genre de traitement vous pensez avoir besoin ?**

Questions intéressantes à poser

- **Si vous aviez une personne plus âgée dans votre famille, qu'est ce que cette personne dirait à propos de votre maladie et du traitement approprié ?**

- **Quels sont ou pourraient être les conséquences de ce problème pour vous et votre famille ?**

- **Quelles sont vos attentes par rapport au progrès de votre maladie. Imaginez vous que ça va vite se guérir ou plutôt lentement ?**
-
- **Comment est ce que les hommes et les femmes expriment ?**
- la colère
- la honte
- la culpabilité
- la tristesse
- la peur
- le dégoût
- la joie
-
- **Comment est ce que je pourrais reconnaître ces émotions dans votre expression ?**
-



LE GUÉRISSEUR TRADITIONNEL :
RÉGULATEUR DE L'ORDRE SOCIAL

- ✓ Initiation : acquérir la vision
- ✓ La vision : révélation de la violence entre les hommes (rancune)
- ✓ Cérémonie de l'Esa : thérapie familiale
 - ✓ Préparation psychologique
 - ✓ Les fautes sont avouées
 - ✓ Sacrifice
 - ✓ Repas de réconciliation



La gestion de l'intentionnalité invisible :
Garantie d'une paix sociale

- ✓ Sorcellerie et envoûtement
 - ✓ Explication de l'irrationnel
 - ✓ Exutoire pour libérer les tensions
- ✓ Antidote à la violence : les ngangas
 - ✓ Repérer les conflits inavoués
- ✓ Rituels : véritables batailles
- ✓ Recrée des appartenances - Mettre du lien



Le Shamanisme

« Un chaman est celui ou celle, qui par la maîtrise de ses états de conscience, peut être en relation avec les mondes non manifestés, souvent appelés monde du nagual, qui vont alors lui apporter des réponses, nouvelles perspectives, moyens de guérir, visions du futur ou de directions nouvelles ; il saura ensuite les comprendre et les transmettre afin que ces réponses servent au bien-être de sa communauté, de sa famille, et de lui même. »

Maud

SEJOURNANT



La thérapie traditionnelle, une thérapie systémique

- ✓ Fabriquent du ciment social
- ✓ Contraignent à s'interroger sur les humiliations, les manques de respect.
- ✓ Elles sont donc une école de respect social
- ✓ La maladie est l'occasion pour la famille d'amorçoir les tensions, de traiter de la rancune et de la violence.
- ✓ Interrogent le fonctionnement affectif de chacun, de soi et de l'autre
- ✓ Sont de véritables thérapies familiales
 - ✓ la situation problème se substitue au patient problème
 - ✓ les symptômes ou problèmes sont l'expression de conflits interrelationnels
 - ✓ le soutien du groupe diminue l'impact de la tension sur le malade




UN CADRE D'ACCOMPAGNEMENT À
GÉOMÉTRIE VARIABLE

- « Nous avons eu beaucoup de problèmes avec les travailleurs de la santé mentale occidentaux qui sont venus ici immédiatement après le génocide et nous avons dû demander à certains d'entre eux de partir.
- Ils sont venus et leur pratique ne consistait pas à être dehors au soleil, là où vous commencez à vous sentir mieux, il n'y avait pas de musique ni de batterie pour que votre sang coule à nouveau, rien ne donnait l'impression que tout le monde avait pris la journée pour que toute la communauté puisse se réunir pour essayer de vous élever et vous ramener à la joie, il n'y avait aucune reconnaissance de la dépression en tant que quelque chose d'envahissant et d'extérieur qui pourrait en réalité être rejeté à nouveau.
- Au lieu de cela, ils emmenaient les gens un par un dans ces petites pièces sales et les faisaient asseoir pendant une heure environ pour parler des mauvaises choses qui leur étaient arrivées. Nous avons dû leur demander de partir.
- ~ Un Rwandais s'est entretenu avec un écrivain occidental, Andrew Solomon, à propos de son expérience en matière de santé mentale et de dépression chez les occidentaux.

La croissance post traumatique



Sortir de sa zone de confort





La croissance post-traumatique Calhoun et Tedeschi (1999, 2006)

- Au delà de la résolution de l'expérience traumatique, se relever d'une telle expérience mène à « la croissance post-traumatique »

- 5 Facteurs examinés en 21 questions :

1. Les relations aux autres
2. Des nouvelles possibilités/perspectives
3. La force psychique de la personne
4. Les modifications d'ordre spirituel
5. L'appréciation de la vie



La croissance post-traumatique Calhoun et Tedeschi (1999, 2006)

- Au delà de la résolution de l'expérience traumatique, se relever d'une telle expérience mène à « la croissance post-traumatique »

- 5 Facteurs examinés en 21 questions :

1. Les relations aux autres
2. Des nouvelles possibilités/perspectives
3. La force psychique de la personne
4. Les modifications d'ordre spirituel
5. L'appréciation de la vie

La croissance post-traumatique concrètement

1. Les relations aux autres

- 6. Je vois clairement que je peux compter sur des personnes lorsque les temps sont durs
- 8. Je ressens davantage que je suis proche avec d'autres personnes
- 9. Je suis plus disposé à exprimer mes émotions
- 15. J'ai plus de compassion pour autrui
- 16. Je fais plus d'efforts pour maintenir mes relations
- 20. J'ai beaucoup appris sur le fait qu'il y a des gens merveilleux
- 21. J'accepte mieux avoir besoin des autres

© H.Dellucci - Cercle de Compétences

La croissance post-traumatique

2. Des nouvelles possibilités/perspectives

- 3. J'ai développé de nouveaux domaines d'intérêt
- 7. J'ai établi un nouveau chemin de vie
- 11. Je suis capable de faire de meilleures choses de ma vie
- 14. Il y a de nouvelles opportunités qu'il n'y aurait pas eues sans ce qui m'est arrivé
- 17. Je suis plus à même d'essayer de changer les choses qui doivent l'être

© H.Dellucci - Cercle de Compétences

La croissance post-traumatique

3. La force psychique de la personne

- 4. Je peux davantage me fier à moi-même/un sentiment d'autonomie
- 10. J'ai appris que je peux mieux gérer les difficultés
- 12. Je peux mieux accepter la manière dont les choses se passent
- 19. J'ai découvert que j'étais plus fort-e que je pensais l'être

© H.Dellucci - Cercle de Compétences

La croissance post-traumatique

4. Les modifications d'ordre spirituel

- 5. J'ai une meilleure compréhension des questions spirituelles
- 18. Je suis davantage croyant-e

5. L'appréciation de la vie

- 1. J'ai changé mes priorités en rapport avec ce qui est important dans la vie
- 2. J'ai une plus grande appréciation de la valeur de ma vie
- 13. Je peux mieux apprécier chaque jour

© H.Dellucci - Cercle de Compétences



La croissance post- traumatique

Post Traumatic Growth Inventory						
Domaines de Changements Possible		1	2	3	4	5
1	Je change mes priorites concernant ce qui est important dans ma vie.					
2	J'ai une plus grande appreciation de ce qui est important dans la vie.					
3	Je developpe de nouveaux interets.					
4	J'arrive a mieux compter sur moi-meme.					
5	J'ai une meilleure comprehension de la spiritualite.					
6	Je conçois plus clairement le fait que je peux compter sur les autres dans les moments difficiles.					
7	J'etablis un nouveau chemin de vie.					
8	Je suis plus dispose a creer des liens avec les autres.					
9	Je suis plus dispose a exprimer mes emotions.					
10	Je me sens plus capable de gerer les difficultes.					
11	J'arrive a mieux vivre ma vie.					
12	J'arrive a mieux accepter la maniere dont se passent les choses.					
13	J'arrive a mieux apprecier chaque jour.					
14	De nouvelles opportunités se sont ouvertes qui n'auraient pas existées sinon.					
15	J'ai plus de compassion pour les autres.					
16	Je fais plus d'effort dans mes relations avec les autres.					
17	Il est plus probable que j'essaye de changer les choses qui ont besoin de changer.					
18	Mes convictions religieuses sont plus fortes.					
19	J'ai decouvert que je suis plus fort que ce que je pensais.					
20	J'ai decouvert a quel point les autres sont formidables.					
21	J'accepte mieux d'avoir besoin des autres.					
0 ->	Je ne vis pas cette experience comme etant une consequence de la crise que je vis					
1->	Je vis cette experience a un degre tres faible comme etant une consequence de la crise que je vis					
2->	Je vis ce changement a un faible degre comme etant une consequence de la crise que je vis					
3->	Je developpe de nouveaux interets					
4->	Je vis cette experience a un fort degre comme etant une consequence de la crise que je vis					
5->	Je vis cette experience a un tres fort degre comme etant une consequence de la crise que je vis					




Le CV des ressources


CV des ressources



- ✓ Les traumatismes empêchent la personne de percevoir ses ressources : c'est à nous de l'aider à les retrouver, les identifier et les noter
- ✓ Si la personne est là, cela signifie qu'elle a des ressources de survie
- ✓ Questions centrées ressources / compétences (plutôt que sur les manquements/traumas)
- ✓ Attitude basiquement humaine : regarder la personne telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses ressources (et non pas à travers ce qu'elle a enduré)



- ✓ Pas de détails traumatiques avant la phase de stabilisation (uniquement détails de surface)
- ✓ « *Je peux tout entendre, mais je n'ai pas besoin de tout savoir* » D HELLER
- ✓ Résistez à la possible fascination concernant l'histoire traumatique
- ✓ Après avoir identifié les ressources de survie, se concentrer sur les ressources qui aident la personne dans sa vie quotidienne




A VOUS D'EXPERIMENTER !



- ✓ Formez un binôme
- ✓ Un « patient » + un accompagnant
- ✓ Le patient décrit quelques expériences adverses
- ✓ L'accompagnant écoute, questionne sur les compétences de survie et note ce qu'il apprend sur le CV de ressources du patient
- ✓ Pour les accompagnants :
 - ✓ Pas de détails traumatiques
 - ✓ Si c'est nécessaire, ajoutez des exercices d'ancrage
 - ✓ Soignez votre respiration: lente, profonde, demandez au patient dès que c'est pertinent de prendre une respiration
 - ✓ Adaptez votre rythme
 - ✓ Si vous avez une indication, veuillez noter la tendance d'activation de la personne
- ✓ **But:** rechercher votre confort physiologique, ainsi que celui du patient
- ✓ Puis changez de rôle 2 x 20 min

La routine énergétique



Points R-27

Thymus (Sternum)
Points de la Rate

www.yves-wauthier.com
info@yves-wauthier.com

2

LES COMPÉTENCES CULTURELLES ET COMMUNAUTAIRES





La thérapie communautaire



Les principes de la thérapie communautaire

- ✓ Pensée systémique : je fais partie du problème et de la solution
- ✓ Théorie de la communication : tout symptôme a valeur de communication et est codé culturellement





Etapes de la Thérapie communautaire

- ✓ ACCUEIL (+ ou - 7 min)
- ✓ CHOIX DU THEME (+ ou -10 min)
- ✓ CONTEXTUALISATION (+ ou -15 min)
- ✓ PROBLEMATISATION (+ ou - 45 min)
- ✓ CLOTURE (+ ou - 15min)
- ✓ EVALUATION, REFLEXION ET LEÇONS QU'ON EN TIRE (+ ou 5 min)





Thérapie communautaire

Travailler en même temps sur les ressources individuelles et collectives

Sentiment d'appartenir au « Nous », de revenir dans la communauté des vivants

Dynamique

Solidarité et Respect des différences

Joyeux